

#### 19.4.1.4 Patroszenie

Tuszki drobiowe należy patroszyć z zachowaniem następujących zasad:

- tuszki i wnętrzności należy zawiesić w sposób umożliwiający zbadanie wewnętrznej jamy ciała, wnętrzności i zewnętrznej strony tuszki (zob. odpowiednie Standardy Prezentacji w niniejszym rozdziale);
- zakumulowana woda obecna w obszarze odpowietrzania musi zostać usunięta przed otwarciem tuszki;
- integralność przewodu pokarmowego musi zostać utrzymana podczas wszystkich operacji odpowietrzania, otwarcia i patroszenia w przypadku wszystkich gatunków drobiu, w tym ptaków łownych (zob. Standardy Patroszenia opisane w niniejszym rozdziale);
- wykonane nacięcie nie powinno być dłuższe niż jest to wymagane, aby umożliwić patroszenie;
- ręce lub urządzenia muszą być dokładnie oczyszczone przed włożeniem ich do jamy brzusznej.

Po przeprowadzeniu badania poubojowego wszystkie wnętrzności łącznie z przełykiem, wolem, kloaką, płucami, tchawicą, nerkami i narządami rozrodczymi usuwa się z tuszki przed myciem końcowym i postępuje się z nimi jak z materiałem niejadalnym.

**Uwaga:** w przypadku młodych kurcząt poniżej 2,7 kg średniej żywej wagi lub młodych kaczek poniżej 4 kg średniej żywej wagi nerki i narządy rozrodcze mogą pozostać w tuszce.

Gruczoły łojowe, wola i tchawice to produkty niejadalne i można je wykorzystać jako paszę dla nerek lub do przygotowania innej paszy dla zwierząt.

Przed wprowadzeniem do systemu chłodzenia należy odpowiednio umyć wewnętrzny i zewnętrzny obszar tuszki.