

Kryteria mikrobiologiczne dla importowanego mięsa – Singapur

(Tłumaczenie robocze)

Plan pobierania próbek– pięć próbek (5)

| 1. Schłodzone mięso/podroby | n | c | m | M |
|---|----------|----------|--|--|
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 5 | 3 | 1.0×10^6 | 1.0×10^7 cfu/g |
| E.coli (kałowe) | 5 | 2 | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (S.aureus) | 5 | 2 | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | 5 | 1 | Salmonella spp. z wyjątkiem S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis | S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| | | | | |
| 2. Mrożone mięso/podroby | | | | |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 5 | 3 | 5.0×10^5 | 1.0×10^7 cfu/g |
| E.coli (kałowe) | 5 | 2 | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (S.aureus) | 5 | 2 | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | 5 | 1 | Salmonella spp. z wyjątkiem S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis | S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| | | | | |
| 3. Rozdrobnione mięso mrożone (włączając mięso mielone, pasta mięsna, pasztet, paszteciki, burgery, kiełbasy i podobne produkty) | | | | |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 5 | 3 | 1.0×10^6 | 1.0×10^7 cfu/g |
| E.coli (kałowe) | 5 | 2 | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (S.aureus) | 5 | 2 | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonella spp.</i> | 5 | 1 | Salmonella spp. z wyjątkiem S. | S. Typhi S. Paratyphi i S. |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------------|
| | | | Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis | Enteritidis |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | 5 | 0 | Nie wykryto | |

Plan pobierania próbek – trzy próbki (3)

| 1. Schłodzone mięso/podroby | n | c | m | M |
|---|----------|----------|-------------------|-------------------------|
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 3 | 1 | 1.0×10^6 | 1.0×10^7 cfu/g |
| <i>E.coli</i> (kałowe) | 3 | 1 | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (<i>S.aureus</i>) | 3 | 1 | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | 3 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | 3 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | 3 | 0 | Nie wykryto | |
| | | | | |
| 2. Mrożone mięso/podroby | | | | |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 3 | 1 | 5.0×10^5 | 1.0×10^7 cfu/g |
| <i>E.coli</i> (kałowe) | 3 | 1 | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (<i>S.aureus</i>) | 3 | 1 | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | 3 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | 5 | 0 | Nie wykryto | |
| | | | | |
| 3. Rozdrobnione mięso mrożone (włączając mięso mielone, pasta mięsna, pasztet, paszteciki, burgery, kiełbasy i podobne produkty) | | | | |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 3 | 1 | 1.0×10^6 | 1.0×10^7 cfu/g |
| <i>E.coli</i> (kałowe) | 3 | 1 | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (<i>S.aureus</i>) | 3 | 1 | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | 3 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | 3 | 0 | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | 3 | 0 | Nie wykryto | |

Plan pobierania próbek – jedna próbka (1)

| 1. Schłodzone mięso/podroby | Przyszłe przesyłki objęte nadzorem m | Przesyłki do odrzucenia M |
|---|---|--|
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 1.0×10^6 | 1.0×10^7 cfu/g |
| E.coli (kałowe) | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (S.aureus) | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | Nie wykryto | S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | Nie wykryto | |
| | | |
| 2. Mrożone mięso/podroby | | |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 5.0×10^5 | 1.0×10^7 cfu/g |
| E.coli (kałowe) | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (S.aureus) | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | Nie wykryto | S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | Nie wykryto | |
| | | |
| 3. Rozdrobnione mięso mrożone (włączając mięso mielone, pasta mięsna, pasztet, paszteciki, burgery, kiełbasy i podobne produkty) | | |
| Ogólna liczba drobnoustrojów | 1.0×10^6 | 1.0×10^7 cfu/g |
| E.coli (kałowe) | 1.0×10^2 | 5.0×10^2 cfu/g |
| Gronkowce koagulazo-dodatnie (S.aureus) | 5.0×10^2 | 1.0×10^3 cfu/g |
| <i>Salmonellaspp.</i> | Nie wykryto | S. Typhi S. Paratyphi i S. Enteritidis |
| <i>Listeriamonocytogenes</i> | Nie wykryto | |
| <i>E.coli</i> O157:H7 | Nie wykryto | |