



Choroby mięczaków

Nazwa choroby	Gatunki wrażliwe i wektory	Objawy kliniczne	Drogi szerzenia	Występowanie w Polsce
Mikrocytoza (zakażenie wywoływane przez <i>Mikrocytos mackini</i>)	Gatunki wrażliwe: <i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea sikamea</i> , <i>Ostrea edulis</i> Wektory: <i>Crassostrea virginica</i>	- zmiany ogniskowe o charakterze owrzodzeń, ropni, krost, zwykle barwy zielonej lub żółtobrazowej, lub bezbarwne o średnicy do 5 mm w tkankach miękkich - brązowe blizny na muszli - ropnie w okolicy płaszczu - otwarta muszla lub powolne otwieranie muszli (osłabienie) - wiosną lub w zbiornikach, w których temperatura wynosi $< 10^{\circ}\text{C}$ - ostrygi zwykle w dobrej kondycji aż do czasu śmierci	- kontakt bezpośredni - zakażenie możliwe w trakcie pobierania pokarmu - poprzez zainfekowane hemocyty	NIE
Perkinsoza (zakażenie wywoływane przez <i>Perkinsus marinus</i>)	Gatunki wrażliwe: <i>Crassostrea gigas</i> , <i>Crassostrea virginica</i>	- choroba o charakterze przewlekłym - wyniszczenie - otwarta muszla - ciężkie, wodniste tkanki - martwe mięczaki	- kontakt bezpośredni - szerzenie wraz z odchodami i martwymi tkankami gospodarza - zakażenie możliwe w trakcie pobierania pokarmu	NIE
Bonamioza (zakażenie wywoływane przez <i>Bonamia exitiosa</i>)	Gatunki wrażliwe: <i>Crassostrea ariakensis</i> , <i>Crassostrea virginica</i> , <i>Ostrea puelchana</i> , <i>Ostrea angasi</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea equestris</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Ostrea lurida</i>	- żółte przebarwienia skrzeli i płaszczu - normalny wygląd mimo infekcji - otwarte muszle - martwe mięczaki	- kontakt bezpośredni - zakażenie w trakcie pobierania pokarmu	NIE
Bonamioza (zakażenie wywoływane przez <i>Bonamia ostreae</i>)	Gatunki wrażliwe: <i>Crassostrea ariakensis</i> , <i>Ostrea chilensis</i> , <i>Ostrea edulis</i>	- żółte przebarwienia skrzeli i płaszczu - wrzody perforujące tkankę łączną skrzeli, płaszczu oraz gruczołów trawiennych - otwarte muszle - martwe mięczaki	- kontakt bezpośredni - żywicielem pośrednim może być węzowidło z gatunku <i>Ophiothrix fragilis</i>	NIE
Marteilioza (zakażenie wywoływane przez <i>Marteilia refringens</i>)	Gatunki wrażliwe: <i>Chamelea gallina</i> , <i>Ostrea edulis</i> , <i>Ostrea stentina</i> , <i>Solen marginatus</i> , <i>Xenostrobus securis</i>	- odbarwienie gruczołów trawiennych (z brązowych do bładożółtych) - podatność na stres środowiskowy - martwe mięczaki	przy udziale żywiciela pośredniego (m.in. <i>Paracartia grani</i>)	NIE

