



Główny Inspektorat Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wiosenna-wiremia-karpi-spring-viremia-of-carp-scv>

Wiosenna wiremia karpi (Spring viremia of carp - SVC)

1. Czynniki etiologiczne:
 - wirus wiosennej wiremii karpi - SVCV, *Carp sprivivirus*
 - Rodzina *Rhabdoviridae*
 - Rodzaj *Sprivivirus*
2. Gatunki utrzymywane w polskich hodowlach:
 - karp i inne ryby karpowate (*Cyprinidae*)
 - wylęg suma pospolitego (*Silurus glanis*)
3. Objawy kliniczne:
 - letarg
 - odłączanie od ławicy
 - zaburzenia równowagi
 - błądź skrzeli
 - poszerzenie jamy brzusznej
 - wytrzeszcz oczu
4. Drogi rozprzestrzeniania się wirusa:
 - za pośrednictwem ryb (ryby chore oraz ryby nosiciele)
 - szerzenie wraz z odchodami, śluzem ze skrzeli i skóry oraz moczem
 - w małym stopniu wirus może być przenoszony wraz z ikrą
 - szerzenie za pośrednictwem wody, mułu, ptaków, pasożytów zewnętrznych oraz sprzętu rybackiego
5. Ostatni zgłoszony przypadek w 2019 r.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

